

Referat og repetition fra Turen den 27. april

En dejlig tur i forårsskoven i Stenderup Sønderskov

Følgende plantefamilier blev demonstreret - sete arter i parentes:

Ranunkelfamilien

Blomster er undersædige og oftest regelmæssige 5-tallige med mange (over 10) støvdragere og grifler. Urter med spredte, oftest håndfligede blade. Blomsterne er ofte skinnende gule - evt. hvide eller blålige. (Hvid Anemone, Vorterod, Nyrebladet Ranunkel, Uldhåret Ranunkel)

Nellikefamilien

Blomster er sædvanligvis hvide eller rødlige, 5-tallige, undersædige og sidder i to-armede kvaste. Mange arter har mere eller mindre kløvede kronblade. Bladene er hele og modsatte, oftest smalle og helrandede. (Stor Fladstjerne, Almindelig Fuglegræs, Skov-Fuglegræs, Skovarve)

Violfamilien

Blomsten er meget karakteristisk med to opadrettede, to udadrettede og ét nedadrettet kronblad. Det nederste kronblad har forneden en lys plet og mørkere striber, som leder insekterne ind til den sækformede spore. (Skov-Viol, Krat-Viol eller krydsninger mellem de to arter)

Kurvblomstfamilien

Blomsterne er små og sidder samlet i en kurv, som er omgivet af højblade, det såkaldte kurvsvøb. (Mælkebøtte)

Læbeblomstfamilien

Urter med 4-kantet stængel og modsatte blade. Blomster 2-læbede, ofte tilsyneladende kransstillede, 4 støvdragere - to korte og to lange. Én griffel med to støvfang - frugten en 4-delt spaltefrugt. (Korsknap, Almindelig guldnælde)

Korsblomstfamilien

Blomster oftest gule eller hvide med 4 kronblade og 4 bægerblade. Der er 6 støvdragere, hvoraf de to er ganske korte. Frugten er en skulpe. Planten har ofte en stærk krydret duft ved knusning af blade. (Løgekarse, Skov-Springklap)

Krapfamilien

Urter med kransstillede blade og 4-kantet stængel. Blomsterne er små, oftest hvide med 3 - 4 kronblade og sidder ofte mange tæt sammen. (Skovmærke, Burre-Snerre)

Rosenfamilien

Blomster ofte 5-tallige, gerne hvide, rødlige eller gule med mat glans. Der er ofte bibæger - ekstra lille bægerblad mellem de 5 store bægerblade. Der er som regel mange (over 10) støvdragere og grifler. Blomsterne er omkringsædige, men det kan være vanskeligt at se. Fligede og sammensatte blade med fodflige er almindelige. (Eng-Nellikerod, Jordbær-Potentil)

og i øvrigt så vi - vist ikke alle:

Stikkelsbær

Bjerg-Ærenpris

Almindelig Lungeurt

Skov-Star
Stor Frytle
Tyndakset Gøgeurt
Hylster-Guldstjerne
Dansk Arum

Blå oliebiller - 5 hanner og hunner
Aurora
Citronsommerfugl
Skovrandøje

Og så sang der skovsanger ved P-pladsen !